

REVACIL⁺

Désinfectant sans chlore multifonction

- **Revacil⁺** contient un désinfectant sans chlore à base de biguanide, renforcé par un algicide et un anti-calcaire.
- **Revacil⁺** est incompatible avec les traitements au chlore ou au brome.
- Très résistant aux UV et à la chaleur, **Revacil⁺** traite l'eau de la piscine sans altérer la peau ou les maillots.

REVACIL⁺ est utilisé dans le KIT d'entretien mensuel sans chlore REVACIL TCM

Description du conditionnement

	1 L / 1,2 Kg
Bidon : Couleur	Transparent
Hauteur	250 mm
Etiquette	150 x 233
Ligne de visibilité	Oui
Symbole tactile	Oui
Bouchon : Couleur	Bleu
Sécurité enfant	Non
Carton : Kraft + étiquette	Oui
Imprimé	Non
De	12
Livré sur palette Euro de	50 cartons de 12 bidons = 600 bidons

METHODE D'UTILISATION DU KIT REVACIL TCM

1) Méthode des 4 samedis (méthode simplifiée) :

Attention !! REVACIL⁺ ne doit pas être utilisé en même temps que le chlore.

Verser les produits liquides directement dans le bassin (devant les refoulements) et mettre les produits solides dans les skimmers.

Piscines précédemment traitées au chlore : éliminer le chlore avec **STOP-CHLORE**, procéder à un nettoyage complet du filtre et s'assurer 24 heures après le traitement de l'élimination totale du chlore. Puis suivre « traitement de départ ».

Traitement de départ

- Vérifier le pH et si nécessaire le réajuster avec **REVA PLUS** ou **REVA MINUS**
- Verser la totalité du **REVATOP⁺** (attention, respecter les précautions) et filtrer en continu durant 24 heures
- Le lendemain, verser le **REVACIL⁺**

Traitement durant la saison :

4 semaines après le traitement de départ

- **1^{er} samedi** : verser le bidon complet de **REVATOP⁺**
(pour verser le **REVATOP⁺**, mettre le bidon dans l'eau de sorte que le goulot soit au ras de l'eau, afin d'éviter les projections).
- **2^{ème} samedi** : verser la moitié du bidon **REVACIL⁺**



Mareva

- **3^{ème} samedi** : mettre dans le skimmer 1, 2 ou 3 galets de **REVA-ACT** selon la taille de la piscine
(mettre la filtration en continu pendant 6 heures)
- **4^{ème} samedi** : verser la seconde moitié du bidon de **REVACIL⁺**

Remarque : Pour démarrer une piscine neuve nouvellement remplie ou suite à un changement de traitement, ajouter le 1^{er} dimanche : 1 bidon d'1 litre de **REVACIL⁺** (disponible en vente à l'unité).

2) Méthode traditionnelle :

Traitement de départ

- 0.5 litre de **REVACIL⁺** (50 mg/l) pour 10 m³

Traitement hebdomadaire

- maintenir un dosage de 30 à 35 mg/l (à vérifier avec une trousse ou une languette)
- ajouter 1 litre de **REVATOP⁺** et 1 ou plusieurs galets de **REVA-ACT** selon la taille de la piscine
 - . toutes les 4 semaines pour une température de l'eau inférieure ou égale à 25°C
 - . toutes les 3 semaines pour une température de 26°C à 30°C
 - . toutes les 2 semaines si la température de l'eau dépasse 30°C

SECURITE

REVACIL⁺ : Irritant pour les yeux – Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique – Conserver hors de portée des enfants – Eviter le contact avec la peau et les yeux – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste – Ne pas jeter les résidus à l'égout – En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Rincer plusieurs fois le bidon vide dans la piscine avant de le jeter.

COMPOSITION

REVACIL⁺ : Chlorhydrate de PolyHexaméthylène Biguanide + acide phosphonique + ammonium quaternaire polymérisé.

Durée de Conservation : 3 ans

Informations techniques fournies sans garantie contractuelle.



Mareva